

مقدمه:

یکی از انواع موادمخدر که امروزه نسبتاً پر مصرف می باشد ، آیس ، شیشه یا کریستال است. بالاترین سطح مصرف در سنین ۱۵ تا ۲۵ سال می باشد. شکل ظاهری آن شبیه خرده شیشه یا تکه های کوچک یخ است. این ماده در اروپا و آمریکا بیشتر به نام آیس و در خیابان های ایران به نام «مت» و «تینا» نیز می شناسند.



شکل های استعمال:

کریستال معمولاً به شکل های سیگار، بلعیدنی، مایع خوراکی یا تزریقی و در موارد نادر حتی به صورت شیاف مقعدی استعمال می شود. شکل سیگار یا تزریقی آثار تخریب کننده تری دارد ولی متاسفانه

استفاده از نوع سیگار و تنفسی آن شایع تر است.

سوداگران شیشه رابه عنوان ماده ای که اعتیاد نمی آورد یاماده ای برای ترک کراک واوپوئیدها وپاماده ای جهت افزایش میل جنسی به جوانان توصیه می کنند.

تأثیرات ناشی از استعمال کریستال:

از جمله آن می توان به: خشکی دهان، افزایش سرعت تنفس، سردردهای طاقت فرسا، حالت تهوع، تعرق بیش از اندازه بدن، سرگیجه، بالا رفتن فشارخون، بالا رفتن حرارت بدن ، تپش قلب، خشکی، سوزش و ترک لب ها، بزرگ شدن مردمک چشم، سیاهی رفتن چشم، لرزش دست ها و انگشتان، نوعی حالت سرخوشی ، ناآرامی، خشونت و رفتار خصمانه، توهم، پرحرفی، تکرار حرف ها و کارهای ساده، تغییر ناگهانی در رفتار و گفتار و اختلال در درک، اختلال و بی نظمی در وظایف کلیه و ریه اشاره کرد.



استفاده از کریستال می تواند نیاز و فعالیت جنسی فرد را به طور غیرعادی افزایش دهد. البته اکثر این علائم مصرف در مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت فروکش می کند.

عوارض:

عوارض مصرف شیشه به قدری وحشتناک است که حقیقتاً هرویین و یا قوی ترین مخدرهای سنتی در مقابل آن بسیار ضعیف هستند. مصرف کننده شیشه در حالت خماری ، دست به حرکات جنون آمیزی می زند.



بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

معاونت غذا و دارو

علائم ترک:

افسردگی، اضطراب، رعشه، بی حالی
و خستگی، کابوس، افزایش خواب، سردرد، گرفتگی
عضلات و گرسنگی می باشد.

از مهمترین عوارض طولانی مدت مصرف شیشه
که معمولاً بعد از گذشت کمتر از ۶ ماه مصرف خود
را نشان می دهد اختلال شدید در عملکرد دریاچه
پروستات است که معمولاً ادرار و اسپرم با هم دفع
می شوند.

آسیب های شدید کبدی و جوش های صورت ،
ایجاد عفونت در دستگاه گوارش ، خصوصاً روده ها
، کوچک شدن بیضه ها به همراه درد شدید،
تضعیف قوای جنسی، کاهش شدید وزن و کم
خوابی از دیگر عوارض این ماده مخدر خطرناک می
باشد.

آنچه از شیشه باید بدانید.....



دانشگاه علوم پزشکی فسا- معاونت غذا و دارو

واحد نظارت بر دارو و مواد مخدر

تلفن: ۰۷۳۱۲۲۱۶۳۱۳



خطر:

اگر شیشه در دوران حاملگی مصرف شود باعث
تولد نوزادی با وزن کم، دور سر کوچک و عقب
ماندگی ذهنی می شود.



پس از گذشت مدتی از مصرف شیشه فرد شدیداً
بدبین می شود و همه مردم را دشمن خود می
داند. افرادی که کریستال مصرف می کنند می
گویند که نوع افسردگی بعد از مصرف این ماده
مخدر مانند دیگر مواد نیست.